

TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

Aide-mémoire

ARBRES		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Remarques
Nom populaire	Nom latin													
Amélanchier	Amélanchier					F								Après la floraison.
Aubépine	Crataegus						F	F						Après la floraison.
Bouleau	Betula						e	e				F		Uniquement pour la formation.
Caragana pleureur	Caragana arborescens pendula						F							Après la floraison.
Celtis	Celtis													Taille de formation.
Cerisier	Prunus			F	F									Taille de formation, mais après la floraison.
Chêne	Quercus				F	F								Taille de formation.
Érable	Acer						e	e				F		Vers le 15 novembre.
Févier	Gleditsia				F	F						F		Taille de formation.
Frêne	Fraxinus											F		Éviter de tailler la branche centrale.
Ginkgo biloba	Ginkgo biloba				F	F								Uniquement pour la formation.
Hêtre	Fagus			F	F	F								Taille de formation.
Hydrangée sur tige	Hydrangea paniculata grandiflora				F	F								Plus on taille court, plus grosses sont les fleurs.
Lilas	Syringa													Après la floraison.
Marronnier	Aesculus													Après la floraison.
Micocoulier	Catalpa				F	F								Tailler le bois mort et pour la formation.
Mûrier	Morus				F									Tailler court.
Noyer	Juglans											F		Tailler très peu. À l'automne seulement.
Orme	Ulmus											F		Taille de formation.
Peuplier	Populus			F	F	F						F		Supporte très bien la taille, mais évitez de tailler de grosses branches.
Pommier	Malus			F	F			e						Taille de formation en mars et avril. Taille des gourmands en été.
Prunier	Prunus			F	F									Taille de formation, mais après la floraison.
Robinier	Robinia											F		Une taille sévère provoque la prolifération de rejets.
Saule	Salix			F	F	F								Une taille sévère de grosses branches pourrait faire pourrir la souche.
Sorbier des oiseaux	Sorbus				F									Sensible aux maladies, ne pas tailler de grosses branches.
Sumac	Rhus typhina				F									Tailler tôt au printemps.
Tilleul	Tilia			F	F	F						F		Taille de formation.

Légende

- e Taille légère d'entretien. Petites branches, branches croisées, abîmées, mortes. Gourmands.
F Taille de formation afin d'aérer et structurer l'arbre. Grosses branches.

TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

Aide-mémoire

ARBUSTES		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Remarques
Nom populaire	Nom latin													
Acacia rose	Robinia hispida													Supporte bien la taille qui intervient après la floraison.
Amélanchier	Amélanchier				F	F								Tailler après la floraison.
Arbre à perruque	Cotinus							F						La taille est peu nécessaire, si besoin après la floraison.
Arbuste aux papillons	Buddleia				F									Tailler 6 à 8 pouces près du sol.
Argousier	Hippophae													Tailler seulement pour en contrôler le développement.
Aronie	Aronia					F	F							Tailler après la floraison.
Azalée	Azalea					F	F							Tailler après la floraison.
Berberis	Berberis				F									La taille est peu nécessaire, il pousse déjà bien formé.
Bouleau nain	Betula pendula											F		Peu utile.
Camerise	Lonicera						F	F						Tailler après la floraison.
Caragana arborescent	Caragana arborescens				F		F							Si une taille forte est nécessaire, en début avril. Sinon après la floraison.
Cerisier des sables	Prunus depressa				F	F								Tailler après la floraison.
Clèthre	Clethra				F	F								Tôt au printemps
Cognassier	Chaenomeles					F	F							Tailler après la floraison.
Cornouiller	Cornus				F	F		F						Tôt au printemps
Cotonéaster de Pékin	Cotoneaster acutifolia				F	F								Tailler le bois mort.
Diervillée	Diervilla				F									Si nécessaire, tôt au printemps. Supporte le rabattage.
Érable à Giguère	Acer negundo					F								Une taille courte favorise les nouvelles pousses.
Érable de l'amour	Acer ginnala			F	F	F	e	e	e	e				Une taille courte sur les nouvelles pousses.
Érable du Japon	Acer palmatum				F	F								Tailler les branches mortes au printemps.
Faux amandier	Prunus triloba ou tennella				F	F								Tailler immédiatement après la floraison.
Forsythia	Forsythia					F								Tailler après la floraison.
Fusain	Eunonymus fortunei				F	F								Pour la forme et les branches mortes.
Fusain ailé	Enonymus alata				F	F		e	e					Pour la formation seulement.
Fusain d'Europe	Euonymus europeus				F	F								Pour la formation seulement.
Gadelier alpin	Ribes alpinum				F	F	F	e	e	e	e	F		Tailler après la floraison ou presque en tout temps si on a une haie.
Genêt	Genista													Tailler après la floraison.
Hamamelis	Hamamelis													Tailler légèrement après la floraison.
Houx verticillé	Ilex verticillata											F		Taille d'entretien. On réduit du tiers les vieilles tiges au sol chaque année.
Hydrangée 'Annabelle'	Hydrangea arborescens 'Annabelle'				F	F								Tailler tôt au printemps plutôt qu'à l'automne.
Hydrangée bleue	Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue'													Tailler après la floraison.
Hydrangée paniculée	Hydrangea paniculata				F	F					F			Tailler court au printemps donne moins de fleurs, mais plus grosses.
Lilas	Syringa						e							Tailler après la floraison et légèrement.
Magnolia	Magnolia					e								Après la floraison, mais très légèrement.

Légende

- e Taille légère d'entretien. Petites branches, branches croisées, abimées, mortes. Gourmands.
- F Taille de formation afin d'aérer et structurer l'arbre. Grosses branches.

TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

Aide-mémoire

ARBUSTES (suite)		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Remarques
Nom populaire	Nom latin													
Millepertuis	Hypericum				F									Tailler tôt au printemps avant que les feuilles n'apparaissent.
Myrique baumier	Myrica gale				F									Pour contrôler son développement, mais peu utilisée.
Nerprun	Rhamnus				F									Tailler avant le débourrement des bourgeons au printemps.
Noisetier tortueux	Corylus contorta													Inutile.
Olivier	Elaeagnus						F	F						Sensible aux maladies.
Physocarpe	Physocarpus				F	F	e	e	e	e				Tailler après la floraison. Pour les haies de juin à août.
Potentille	Potentille				F	F	F	e	e	F				La taille s'effectue au printemps et peut être plus ou moins courte selon le cas.
Prunier des sables pourpres	Prunus x cistena				F	F	e	e	F	e				Pratiquer une taille de nettoyage au printemps et après la floraison.
Ronce odorante	Rubus odoratus				F									Supporte le rabattage, mais celui-ci favorisera son expansion.
Saule arctique nain	Salix purpurea 'Gracilis'				F	F	F	e	e	e	e	F		Supporte bien une taille de rabattage. Peut être taillé du printemps jusqu'aux gelées.
Saule maculé	Salix integra 'Hakuro Nishiki'				F									Rabattre les tiges tous les printemps pour favoriser la coloration des pousses.
Seringat doré	Philadelphus coronarius						F	F						Tailler après la floraison.
Seringat virginal	Philadelphus virginialis							F						Tailler après la floraison.
Shépherdie	Shepherdia				F									Tailler au printemps avant les feuilles.
Fausse spirée	Sorbaria				F	F					F			Tailler court 6 à 8 pouces du sol.
Spirea Van Houtte	Spirea Van Houtte						F							Tailler après la floraison.
Spirée de Billard	Spirea billardii				F									Tailler court au printemps. En été tailler juste sous les fleurs, ils refleuriront.
Spirée de Grefsheim	Spirea x cinerea					F								Tailler après la floraison.
Spirée du Japon	Spirea bumalda ou japonica				F		e	e	e					Tailler court au printemps. En été, tailler juste sous les fleurs, ils refleuriront.
Stephanandra	Stephanandra				F	F								La taille en est une de nettoyage.
Sumac vinaigrier	Rhus typhina				F									Tailler tôt au printemps si nécessaire.
Sureau	Sambucus				F	F	e	e	e	e				Tailler tôt au printemps avant les feuilles.
Symphorine	Symphoricarpos				F	F								Tailler au printemps pour préserver les fruits.
Viburnum	Viburnum				F	F								Tailler après la floraison si on ne désire pas de fruits, sinon on ne taille pas.
Viorne	Tamarix				F									Tailler court au printemps pour favoriser la floraison.
Weigella	Weigella				F	F	e	e	e					La taille en est une de nettoyage au printemps et par la suite taille légère après la floraison.

Légende

- e Taille légère d'entretien. Petites branches, branches croisées, abimées, mortes. Gourmands.
F Taille de formation afin d'aérer et structurer l'arbre. Grosses branches.

TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

Aide-mémoire

ARBUSTES à feuillage persistant		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Remarques
Nom populaire	Nom latin													
Andromède	Andromeda				F									Tailler seulement les branches mortes.
Bruyère automne	Calluna				F									Tailler seulement les branches mortes.
Bruyère printemps	Erica				F									Tailler seulement les branches mortes.
Cotonéaster de Dammer	Cotoneaster dammeri				F	F								Tailler pour contrôler son développement dans une intersection de branches.
Daphné	Daphne				F									Tailler seulement les branches mortes.
Fusain de fortune	Euonymus fortunei				F	F								Pour la forme et les branches mortes.
Houx	Ilex				F									Tailler seulement les branches mortes.
Mahonia	Mahonia				F									Supporte bien la taille qui encourage la ramification. Tailler après la floraison.
Raisin d'ours	Arctostaphylos				F									Tailler seulement les branches mortes.
Rhododendron	Rhododendron					F								Tailler seulement les branches mortes ou après la floraison.
Thé des bois	Gaultheria				F									Tailler seulement les branches mortes.
Thé du Labrador	Ledum groenlandicum				F									Tailler seulement les branches mortes.
Yucca	Yucca				F									Tailler seulement les branches mortes.


Légende

- e Taille légère d'entretien. Petites branches, branches croisées, abîmées, mortes. Gourmands.
- F Taille de formation afin d'aérer et structurer l'arbre. Grosses branches.

TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

Aide-mémoire

CONIFÈRES		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Remarques
Nom populaire	Nom latin													
Cèdre	Thuja			e	e	F	e	F	e	e				Tailler une à deux fois par année vers 24 juin et 8 août.
Cyprès de Russie	Microbiota			F	e	e	e	e	e	F				Inutile ou pour contrôler son développement.
Épinette	Picea				F	F								Tailler au printemps quand la pousse est tendre.
Faux-cyprès	Chamaecyparis			F	e	e	e	e	e	F				Inutile ou tailler en été sur la pousse de l'année.
Genévrier pyramidale	Juniperus érigé					F		F						Tailler en été sur la pousse de l'année.
Genévrier étalé	Juniperus étalé			F	e	e	e	e	e	F				Pour contrôler son développement.
If	Taxus			F	F	F	F	F	F	F				Tailler en été sur la pousse de l'année. Une taille sévère est aussi possible au printemps
Mélèze greffé	Larix greffé			F										Tailler les branches qui se croisent.
Mélèze indigène	Larix laricina			F										Tailler les fausses têtes.
Pin	Pinus				F	F								Tailler en période de chandelle seulement (voir image).
Pin des montagnes	Pinus mugo				F	F								Tailler en période de chandelle seulement (voir image).
Pruche	Tsuga					F								Inutile ou tailler en été sur la pousse de l'année.
Sapin	Abies				F	F								Tailler au printemps quand les pousses sont tendres.



Légende

- e Taille légère d'entretien. Petites branches, branches croisées, abîmées, mortes. Gourmands.
- F** Taille de formation afin d'aérer et structurer l'arbre. Grosses branches.

TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

Aide-mémoire

PLANTES GRIMPANTES		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Remarques
Nom populaire	Nom latin													
Aristolochie	Aristolochia				F									Tailler le bois mort seulement.
Bourreau des arbres	Celastrus				F									Tailler le bois mort seulement.
Chèvrefeuille	Lonicera				F									Tailler le bois mort seulement et aussi pour éclaircir.
Clématite groupe 1	Clematis groupe 1				F									Floraison hâtive tôt au printemps. Tailler le bois mort. On peut rabattre après la première floraison.
Clématite groupe 2	Clematis groupe 2													Floraison hâtive à grandes fleurs. Tailler le bois mort. On peut rabattre après la première floraison.
Clématite groupe 3	Clematis groupe 3													Floraison tardive à partir de juin-juillet. Tailler court au printemps.
Glycine	Wisteria				F									Tailler le bois mort seulement après la floraison.
Grand liseron	Calystegia				F									Tailler au sol.
Humulus (houblon)	Humulus				F									Tailler à plus ou moins 8 pouces du sol.
Kiwi	Actinidia				F									Tailler le bois mort seulement.
Rosier	Rosier				F									Tailler le bois mort seulement.
Thladiantha	Thladiantha				F									Tailler au sol. Comme une vivaces
Vigne vierge	Parthenocissus				F									Tailler le bois mort seulement et aussi pour éclaircir.

Légende

- e Taille légère d'entretien. Petites branches, branches croisées, abîmées, mortes. Gourmands.
- F** Taille de formation afin d'aérer et structurer l'arbre. Grosses branches.

TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

Aide-mémoire

PETITS FRUITS & ARBRES FRUITIERS		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Remarques
Nom populaire	Nom latin													
Amélanchier	Amélanchier					F								Tailler après la floraison seulement si nécessaire.
Asperge	Asparagus officinalis										e			Quand le gel fait mourir le feuillage à l'automne, rabattre ras au sol et pailler de nouveau.
Bleuet	Vaccinium angustifolium				F									Rabattre une à quatre vieilles tiges jusqu'aux jeunes pousses ou jusqu'au sol.
Camerise	Lonicera kamtschatica													Taille d'entretien pour aérer le plan. Tailler au sol les tige de plus de 3 ans
Canneberge	Vaccinium oxycoccus				F									Rabattre une à quatre vieilles tiges jusqu'aux jeunes pousses ou jusqu'au sol.
Josta	Ribes nidigrolaria				F									Rabattre une à quatre vieilles tiges jusqu'aux jeunes pousses ou jusqu'au sol.
Fraise	Fragaria						F	F						Après la production, tailler les plants à 8 cm au-dessus du sol et retirer les feuilles malades.
Framboise	Rubus idaeus				F					F				À l'automne ou au printemps, tailler les cannes brunes qui ont produit l'année précédente.
Gadelle	Ribes sativum				F									Rabattre une à quatre vieilles tiges jusqu'aux jeunes pousses ou jusqu'au sol.
Groseille	Ribes uva-crispa				F									Rabattre une à quatre vieilles tiges jusqu'aux jeunes pousses ou jusqu'au sol.
Mûre	Rubus subgenus													À l'automne ou au printemps, tailler les cannes brunes qui ont produit l'année précédente.
Rhubarbe	Rheum									F	F			Tailler le feuillage et recouvrir de compost ou de fumier.
Vigne à raisin	Vitis			F	F									Taille sévère chaque année. On conserve 3 à 4 bourgeons.
ARBRES														
Cerisier	Prunus			F				e	e					Taille de formation en mars.
Mûrier pleureur	Morus alba pendula				F									Tailler sévèrement au printemps.
Poirier	Pyrus communis			F				e	e					Taille de formation en mars.
Pommier	Malus			F				e	e					Taille de formation en mars.
Pommier colonnaire	Malus columnaris			F				e	e					Taille de formation en mars.
Prunier	Prunus domestica			F				e	e					Taille de formation en mars.

Légende

- e Taille légère d'entretien. Petites branches, branches croisées, abimées, mortes. Gourmands.
- F Taille de formation afin d'aérer et structurer l'arbre. Grosses branches.